

Ankieta określająca potencjalne ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej

Imię

Nazwisko

Tel

E-mail

Proszę zakreślić odpowiednie pozycje oraz zsumować liczbę punktów.

PUNKTY

- | | |
|---|---|
| 1. <u>Wiek</u> | |
| Do 19 lat..... | 0 |
| 20 – 39 lat..... | 1 |
| 40 lat i więcej..... | 2 |
| 2. <u>Nikotyna</u> | |
| Nie palę..... | 0 |
| Palilem (kiedy przestałem) | 1 |
| Palę do 10 papierosów dziennie..... | 1 |
| Palę powyżej 10 papierosów dziennie..... | 2 |
| 3. <u>Alkohol</u> | |
| Piję niewiele alkoholu..... | 0 |
| Piję alkohol 2-3 razy w tygodniu..... | 1 |
| Piję alkohol więcej niż 3-4 razy w tygodniu..... | 2 |
| 4. <u>Uwarunkowania genetyczne</u> | |
| Nikt w najbliższej rodzinie nie choruje na raka (dziadkowie, rodzice, rodzeństwo) | 0 |
| Są lub były przypadki zachorowania na raka w najbliższej rodzinie..... | 1 |
| Choruję lub chorowałem na raka..... | 2 |

Ilość punktów razem:

Punktacja:

0-1 punktów – niewielkie ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, ale zaleca się wykonanie badania kontrolnego raz na 2 lata lub raz na rok w przypadku ryzyka zarażenia wirusem HPV 16/18

2-3 punkty – podwyższone ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, zaleca się wykonanie badania kontrolnego raz w roku

4 punkty i więcej – stosunkowo wysokie i wysokie ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, badanie kontrolne powinno być wykonywane 1 raz w roku; w przypadku zgromadzenia 4 punktów, więcej niż 4 punkty, raz na pół roku

Test przesiewowy wykonany przy pomocy urządzenia Microlux pozwala na wcześniejsze wykrycie stanów patologicznych jamy ustnej w tym stanów nowotworowych.

Stosowanie testu w połączeniu z konwencjonalnym badaniem jamy ustnej znacznie zwiększa możliwości wykrycia podejrzanych zmian błony śluzowej we wczesnych stadiach rozwoju choroby. Test spełnia podobną rolę w badaniach przesiewowych co mammografia, pobranie wymazu z szyjki macicy, PSA.

Jest to prosty, nieinwazyjny i bezbolesny sposób na wykrycie zmian patologicznych błony śluzowej we wczesnych stadiach rozwoju choroby. Wczesne wykrycie zmian o charakterze przednowotworowym może zmniejszyć zakres zabiegu usunięcia ogniska nowotworowego, minimalizując lub eliminując potencjalne skutki uboczne w postaci deformacji tkanek lub nawet uratować życie.

Odwróć

Tak, zgadzam się na wykonanie badania jamy ustnej z zastosowaniem Microlux.

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Nie, nie zgadzam się na wykonanie testu z zastosowaniem Microlux

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Lekarz prowadzący badanie:

Lista gabinetów wykonujących badanie w Polsce znajduje się na stronie www.zusmiechem.org.pl, tam też można znaleźć bardziej szczegółowe informacje o raku jamy ustnej.